

II. Bref historique de la bryologie en Haute-Garonne

Si quelques bryologues français comme Dufour, Grateloup et d'autres ont commencé à s'intéresser aux muscinées pyrénéennes au début du XIX^{ème} siècle, ce sont essentiellement les bryologues étrangers comme Spruce, Müller ou Zetterstedt qui dans les années 1840-1850 ont décrit et révélé la richesse de la flore bryologique pyrénéenne. La ville de Bagnères-de-Luchon, aux thermes réputés, attirait à l'époque nombre de botanistes, qui herborisaient ensuite dans tout le Luchonnais. Ainsi, l'essentiel des travaux de ces bryologues se sont concentrés sur la partie pyrénéenne du département.



Richard SPRUCE




Pierre Tranquille HUSNOT

Suite à ces premiers travaux, Husnot, créateur de la célèbre *Revue Bryologique*, herborisa en 1872 et 1873 dans les Pyrénées et fera part de ses découvertes sous forme d'itinéraire bryologique dans le *Guide du bryologue dans les Pyrénées*. En cette fin de siècle, deux autres bryologues exploreront de manière importante les Pyrénées : Ferdinand Renaud et Ernest Jeanbernat. Ils publieront d'ailleurs ensemble divers articles sous le nom de *Guide du bryologue dans la chaîne des Pyrénées et le sud-ouest de la France*.

Renaud fera de nombreux apports à la bryoflore régionale dans ses *Notices sur les mousses des Pyrénées*. Quant à Jeanbernat, suite à diverses excursions avec son ami botaniste Timbal-Lagrave, il acquiert une connaissance assez approfondie de la bryoflore pyrénéenne, qu'il synthétise (avec l'aide de Renaud) dans un ouvrage remarquable pour l'époque : *Bryogéographie des Pyrénées*. Jeanbernat a également comblé une grosse lacune concernant les espèces de la plaine toulousaine en publiant sa *Flore bryologique des environs de Toulouse*.

Au début du XX^{ème} siècle, Dixon apporte sa pierre à l'édifice et les travaux de Müller et Chalaud viennent combler certaines lacunes concernant les hépatiques de montagne pour le premier et la région toulousaine pour le second. Après cette époque florissante de la bryologie pyrénéenne, succède une période bien plus calme qui s'étend jusqu'à nos jours, (voir l'histogramme ci-après). Seules quelques visites de Pierrot ajouteront de nouvelles données à la fin du XX^{ème} siècle.



Nombre de publications bryologiques concernant la Haute-Garonne en fonction des époques

Plus récemment, le Conservatoire Botanique Pyrénéen a réalisé un *état des lieux sur les bryophytes et les champignons de Midi-Pyrénées* (Corriol *et al.*, 2004). Cet important travail, basé essentiellement sur un dépouillement de la bibliographie donne un bon aperçu de la diversité de la bryoflore à l'échelle régionale. Toutefois, étant donné le nombre de publications, la dispersion des données et les délais restreints pour réaliser cette étude, nombre de publications bryologiques n'ont pu être dépouillées lors de ce travail. Les publications d'Husnot, de Jeanbernat, de Müller, de Spruce et de Zetterstedt n'ayant pas été intégrées, le présent atlas vient donc compléter et préciser cet état des lieux à une échelle départementale.

